



Evaluación del síndrome posterior a la septicemia

Completar después del ingreso al centro con un diagnóstico de septicemia o en cualquier momento después de que el residente haya recibido un diagnóstico de septicemia. Si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas, se recomienda realizar más pruebas, ya que es posible que se requiera otra evaluación y tratamiento para prevenir el ingreso/reingreso al hospital.



Signos/síntomas



- Fiebre superior a 100.4 °F (38 °C) o inferior a 96.8 °F (36 °C)



- Temblores o mucho frío



- La piel cambia de color y se vuelve pálida



- Dolores y molestias en el cuerpo peores que los normales



- Náuseas o vómitos



- Palpitaciones o latidos intermitentes



- Mareos cuando intenta ponerse de pie o desmayos



- Somnolencia, dificultad para despertar



- Confusión



- Falta de aire



- Enrojecimiento, hinchazón o supuración de pus de una herida



- Aumento del dolor, enrojecimiento o calor en un foco de infección



- Enrojecimiento, hinchazón o filtración alrededor de la zona en la que una vía intravenosa se inserta en la pie



- La persona se siente “como si estuviera por morir”

Fuente:

Sepsis Alliance. PSS Letters for Healthcare Professionals and Others. Enero de 2021. Disponible en: <https://www.sepsis.org/sepsis-basics/post-sepsis-syndrome/>