

## Cazadores de mitos de las vacunas

Vacuna contra la neumonía  
(neumococo)

**MITO**

*La neumonía (pulmonía) no es común ni grave.*

*Solo las personas mayores de 65 años de edad necesitan la vacuna contra la neumonía.*

*Usted no puede "contraer" neumonía, así que no hay razón para ponerse la vacuna contra la neumonía.*

**HECHO**

**La neumonía es una infección grave que puede poner la vida en peligro.**

**Las personas con una enfermedad crónica tienen mayor riesgo de neumonía, sin importar la edad.**

**La neumonía se puede propagar al toser o estornudar.**

Vacuna contra la  
hepatitis B

*Usted puede contraer la hepatitis B por ingerir comida contaminada.*

*La hepatitis B no es nada común, por lo que no es necesario vacunarse contra la hepatitis B.*

*Usted puede contraer la hepatitis B por la vacuna.*

**La hepatitis B se propaga a través de la sangre o líquidos corporales infectados.**

**Usted puede tener hepatitis B y no saberlo.**

**La vacuna no contiene el virus vivo, por lo que no puede causar la hepatitis B.**

Hable hoy mismo con el personal encargado de su diálisis para cerciorarse de que haya recibido las vacunas contra la neumonía y la hepatitis B. Ambas vacunas están cubiertas por la Parte B de Medicare.

**Para presentar una queja sobre su centro de diálisis, contacte la Red 17 al 1.800.232.3773.**